

Lea esta información antes de tomar este medicamento.
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda consulte a su médico de confianza.

Feldom®

Composición:

Ampollas Suspensión Tabletas

Diclofenaco Potásico 75 mg/amp.3ml ----- 50 mg/tab.

Diclofenaco Resinato 15 mg/ml

Indicaciones:

Tratamiento breve de aneuritis, dolor postraumático y postoperatorio, inflamación, dismenorrea, anexitis y reumatismo articular; como coadyuvante en las infecciones graves de oído, nariz y garganta.

Dosificación:

Niños a partir de 1 año:

Una gota por kilo de peso, dividido en tres dosis cada 8 horas.

Adultos o niños mayores de 12 años:

• Para dolor de cuerpo: 1 tableta cada 8 horas.

• Para Dismenorrea (dolor menstrual):

2 tabletas cada 12 horas o una tableta cada 6 horas.

• Para Artritis: 1 tableta cada 8 horas.

Ampollas con 75 mg:

Una ampolla por vía intramuscular cada 24 horas mientras exista dolor o inflamación. En casos extremos, puede aumentarse la dosis a una ampolla cada 12 horas.

Contraindicaciones:

Úlcera gástrica o duodenal, hipersensibilidad conocida al diclofenaco o a otros fármacos antiinflamatorios no esteroides.

Precauciones y advertencias:

No administrar en casos de ataque de asma, embarazo y lactancia. Usar con precaución en pacientes de edad avanzada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

Presentaciones:

Feldom® ampollas:

Caja con una ampolla de 3 ml (75 mg) y jeringa descartable.

Feldom® gotas:

Frasco con 15 ml de suspensión al 1.5%

Feldom® tabletas:

Caja con 200 tabletas.

Fecha de última revisión 15-10-2011
Revisado por MMC



Spruyt Gihlem Pharmaceutical

sac@sgmedicinas.com

www.sgmedicinas.com

Para sentirse bien... Muy Bien!